医薬品の提出について

１回分に分け、薬袋に「氏名」「使用の時間」を明記してください。

予備の薬に「予備」と明記してください。

宿泊を伴う行事の時は、１日分を予備として持たせてください。

学校へ依頼する（日中の薬＋予備１回分）

災害時への備え（１日分）



※寄宿舎生は別に説明あり

寄宿舎へ依頼する（朝夕の薬＋予備１日分）・　宿泊を伴う行事（泊数＋予備１日分）

医薬品使用介助依頼書に添付してください。

◎ 薬剤情報提供書

●服用または使用する前に必ずお読み下さい。　　ページ: 1/ 1

No	色・形・記号	名前・効能・効果	用法・用量	注意事項
1		気管支喘息を抑える薬 鼻炎を抑える薬 結膜の炎症を和らげる薬 かぜを和らげる薬	朝 昼 夕 寝前 1 1 1 1回3錠 全270錠 1日3回 毎食前 30日分	◆ 発疹・かゆみ等の過敏症状が現れた時は、お薬の中止を要する場合もありますので、医師または薬剤師にご相談下さい。 ◆ 妊婦または妊娠の可能性のある方は、ご相談下さい。
	この薬品は普からの医薬品です。			
2		メキシレン錠3mg「サワイ」 かゆみを和らげる薬 アレルギーを抑える薬 気管支喘息を改善する薬 ※ジェネリック医薬品	朝 昼 夕 寝前 1回1錠 全10錠 鼻汁時 10回分	◆ 発疹・かゆみ、日光皮膚炎などの過敏症状が現れた時は、お薬の中止を要する場合もありますので、医師または薬剤師にご相談下さい。薬の作用により、眠気をもよおすことがあります。 ◆ 眠気が現れることがありますので、車の運転や危険を伴う作業は控えて下さい。また、薬の作用に影響を及ぼすことがあるので、飲酒は控えるようにして下さい。 ◆ 妊婦または妊娠の可能性のある方は、ご相談下さい。また、授乳中の方は、母乳による授乳を控えて下さい。
3		アレルギーを抑える薬	朝 昼 夕 寝前 全1瓶 1日1回点鼻1噴霧	◆ 発疹・かゆみ等の過敏症状が現れた時は、お薬の中止を要する場合もありますので、医師または薬剤師にご相談下さい。 ◆ 指示された使用方法に従って下さい。鼻をかんでから、鼻腔内に使用して下さい。 ◆ 妊婦または妊娠の可能性のある方、授乳中の方はご相談下さい。
	この薬品には後発医薬品はありません。			
4		アレジオン点眼液0.05% アレルギーを抑える薬	朝 昼 夕 寝前 全5ml 1日4回点眼	◆ 発疹・かゆみ等の過敏症状が現れた時は、お薬の中止を要する場合もありますので、医師または薬剤師にご相談下さい。 ◆ 眼にのみ使用して下さい。指示された使用方法に従って下さい。 ◆ 妊婦または妊娠の可能性のある方は、ご相談下さい。また、授乳中の方は、母乳による授乳を控えて下さい。
	この薬品には後発医薬品はありません。			

【薬局からのお知らせ】
◆ 組み合わせに注意が必要な薬が処方されていることもあります。他の医療機関で処方されたお薬を服用されている場合は、薬剤師までご相談ください。
◆ 当薬局では、在宅患者訪問薬剤管理指導を実施しております。

上記がない場合は、お薬手帳の該当箇所



年　月　日	おくすりの名前、飲み方、注意すること、医療機関名、薬局名、残薬の状況・理由

引換券No: 0038　　1/1

患者名: テスト　一郎 様　　患者ID: 09999999

診療科: 総合内科　　医師名: 総合内科

病棟名:　　調剤日: 2025/ 6/16

1	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	1錠
	レバミピド錠100mg「サワイ」	1錠
	発熱時・疼痛時	10回分